

HISTO-PATHOLOGIE CUTANÉE  
SCP DE MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES

DOCTEUR Ph. CHEMALY  
ANATOMO-PATHOLOGISTE DERMATOLOGISTE  
EX-ATTACHÉ D'HISTOPATHOLOGIE CUTANÉE  
À L'HÔPITAL ST LOUIS

DOCTEUR T. CLÉRICI  
ANATOMO-PATHOLOGISTE DERMATOLOGISTE  
ANCIEN INTERNE ET ASSISTANT DES HÔPITAUX DE PARIS  
ATTACHÉ À L'HÔPITAL AMBROISE PARÉ

DOCTEUR A. LEVY  
ANATOMO-PATHOLOGISTE DERMATOLOGISTE  
ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE MONTPELLIER  
ATTACHÉ À L'HÔPITAL ST LOUIS

DOCTEUR L. PINQUIER  
ANATOMO-PATHOLOGISTE DERMATOLOGISTE  
ANCIEN INTERNE ET ASSISTANT DES HÔPITAUX DE PARIS  
ATTACHÉ À L'HÔPITAL ST LOUIS

DOCTEUR M.D. VIGNON-PENNAMEN  
ANATOMO-PATHOLOGISTE DERMATOLOGISTE  
ANCIEN INTERNE ET CHEF DE CLINIQUE ASSISTANT  
DES HÔPITAUX DE PARIS  
ATTACHÉ À L'HÔPITAL ST LOUIS

Examen N° COA059570 /FO  
Prélèvement effectué le 27 10 2000  
Enregistré le 31 10 2000  
MADAME ANCIAUX Josiane  
55 ans

DOCTEUR BLAISE  
27 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
95200 SARCELLES

**BIOPSIE D'UNE LÉSION CUTANÉE TEMPORALE GAUCHE. SUSPICION DE CARCINOME  
BASOCYLLAIRE**

Ce petit fragment biopsique est revêtu d'un épiderme légèrement épais dont le relief est festonné. Il ne comporte ni désorganisation architecturale ni signe cytologique de malignité. Il existe par ailleurs, à la partie périphérique du prélèvement, un ostium folliculaire dilaté. La derme superficielle, seul intéressé par le prélèvement, est le siège d'une réaction inflammatoire lymphocytaire modérée.

**CONCLUSION :**

Dans les limites de ce petit prélèvement biopsique, les seules anomalies morphologiques observées correspondent à une discrète hyperplasie épidermique bénigne développée dans un contexte inflammatoire vraisemblablement associée à une dystrophie pileaire.

Dr THIERRY CLÉRICI