

IVC

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

CABINET DE PATHOLOGIE TOLBIAC - SCP enregistrée 75.65

92, avenue d'Ivry, 75013 Paris - Tel: 01.45.85.73.40 - Fax: 01.45.85.73.41

DOCTEUR ARIANE LE CAÉ
Ancienne Interne et Assistante des Hôpitaux
Attachée au CHU Cochin-Port-Royal

DOCTEUR M.CH.CHARPENTIER

AHP Ancien Assistant des Hôpitaux
Attaché au CHU Brussais Hôtel-Dieu

DOCTEUR JEAN-FRANÇOIS FINET

Ancien Interne et Assistant des Hôpitaux
Attaché au CHU Pitié-Salpêtrière

DOCTEUR ALIETTE LADOUCH-BADRÉ

Attachée au CHU du Kremlin-Bicêtre

DOCTEUR MARIE-FRANÇOISE TRILLER

Attachée au CHU Cochin et à l'Hôpital Tenon

DOCTEUR FRANÇOIS LE PELLETIER

AHP Ancien Assistant des Hôpitaux
Attaché au CHU Pitié-Salpêtrière

Paris le 20/05/2003

LE DOCTEUR ABOUDARAM

H.P.N.P. CENTRE ALFRED KETZLER
3 BD.DU ML.DELATTRE DE TASSIGNY
95200 SARCELLES

EXAMEN N° 03 05 16H0034
Prescription du 13/05/2003

RM

Mme Josiane ANCIAUX

né(e) le 28/09/1945

HPNP SARCELLES

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : REPRISE D'UN CARCINOME BASO-CELLULAIRE DE LA TEMPE GAUCHE.

MACROSCOPIE :

Cette pièce mesure, après fixation et rétraction,
2 cm de grand axe.

Elle a été examinée en totalité sur plusieurs niveaux de coupes.

HISTOLOGIE :

Cette lésion, mal limitée, est faite de lobules et de travées de cellules basaloïdes appendues à l'épiderme, ou détachées dans le derme réticulaire, avec des mitoses et nécroses, et une disposition palissadique en périphérie. Un espace de rétraction les sépare d'un stroma différent de celui d'une papille pileaire.

CONCLUSION : Carcinome basocellulaire d'architecture infiltrante. Cette lésion atteint les limites latérales de la préparation en plusieurs endroits au niveau du derme réticulaire, elle épargne l'hypoderme. Présence également de quelques foyers de carcinome baso-cellulaire superficiels.

Docteur LE PELLETIER